


Рекомендации по терапии АГ в зависимости от стадии ХБП



Список сокращений: **АМР** — антагонисты минералокортикоидных рецепторов; **ББ** — бета-адреноблокаторы; **БКК** — блокаторы кальциевых каналов; **БРА** — блокаторы рецепторов ангиотензина II; **иАПФ** — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента; **иНГЛТ2** — ингибиторы натрий глюкозного котранспортера 2 типа; **рСКФ** — расчётная скорость клубочковой фильтрации; **Т/ТП** — тиазидный/тиазидоподобный.

Примечание: **Каждый шаг терапии производится через 2–4 недели, достижение целевого АД за 3 месяца!**

Адаптировано из: Артериальная гипертензия у взрослых. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6117. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6117>

Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, с общей характеристикой лекарственного препарата Форсига (дапаглиозин). ООО «Астразенека Фармасьютикалз», 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, этаж 30. Тел.: +7 (495) 799-56-99, www.astrazeneca.ru RU-27787 Дата одобрения: 12.02.2026 Дата истечения: 11.02.2028