

Характеристики ХСН в зависимости от фракции выброса левого желудочка



Тип ХСН	Со сниженной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) (ХСНнФВ)	С умеренно сниженной ФВ ЛЖ (ХСНунФВ)	С сохраненной ФВ ЛЖ (ХСНсФВ)
Критерий 1	Симптомы ± признаки*	Симптомы ± признаки*	Симптомы ± признаки*
Критерий 2	ФВ ЛЖ $\leq 40\%$	ФВ ЛЖ 40–49%**	ФВ ЛЖ $\geq 50\%$
Критерий 3			Объективные признаки структурных и/или функциональных нарушений со стороны сердца, согласующиеся с наличием диастолической дисфункции ЛЖ/повышенного давления наполнения ЛЖ, включая повышенный уровень натрийуретических пептидов***

Примечание: * — симптомы могут отсутствовать на ранних стадиях сердечной недостаточности (СН) или у пациентов, получающих диуретическую терапию.
** — при диагностике ХСНунФВ наличие признаков структурного поражения сердца (например, увеличение размера левого предсердия (ЛП), гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ) или эхокардиографические признаки нарушения наполнения ЛЖ) делает диагноз более вероятным.
*** — концентрическая гипертрофия ЛЖ (индекс массы ЛЖ ≥ 95 г/м² у женщин и ≥ 115 г/м² у мужчин; индекс относительной толщины стенок ЛЖ $>0,42$); расширение левого предсердия (индекс его объема >34 мл/м² при синусовом ритме и >40 мл/м² при фибрилляции предсердий (ФП)); доплеровское соотношение E/e' в покое >9 ; уровень N-концевого пропептида натрийуретического гормона (B-типа) (NT-proBNP)/ мозгового натрийуретического пептида (BNP) $>125/35$ пг/мл при синусовом ритме или $>365/105$ пг/мл при ФП; систолическое давление в легочной артерии >35 мм рт. ст. или скорость трикуспидальной регургитации $>2,8$ м/с. Точность диагностики ХСНсФВ будет тем выше, чем больше этих признаков присутствует у пациента.

Адаптировано из: Галявич А.С., Терещенко С.Н., Ускач Т.М. и соавт. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6162>.

Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, с общей характеристикой лекарственного препарата Форсига (дапаглиозин). ООО «Астразенека Фармасьютикалз», 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, этаж 30. Тел.: +7 (495) 799-56-99, www.astrazeneca.ru
RU-00000 Дата одобрения: 00.00.0000 Дата истечения: 00.00.0000