


# Холистический подход к улучшению исходов у пациентов с СД и ХБП



Список сокращений: **АКО** — отношение альбумина к креатину в моче; **АР ГПП-1** — агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида-1; **АСССЗ** — атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание; **иНГЛТ2** — ингибитор натрий-глюкозного ко-транспортера-2 типа; **РАС** — ренин-ангиотензиновая система; **рСКФ** — расчетная скорость клубочковой фильтрации; **ССЗ** — сердечно-сосудистое заболевание; **PCSK9i** — ингибитор пропротеинконвертазы субтилизин/кексинового типа 9.

Примечание: \* — Ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) или блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА) являются первой линией терапии артериальной гипертензии (АГ) при наличии альбуминурии, дополнительно также могут быть рассмотрены дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (БКК) или диуретики; для достижения целевого артериального давления (АД) часто необходимы все 3 класса препаратов.

† — Финеренон в настоящее время является единственным нестероидным антагонистом минералокортикоидных рецепторов (НС-АМР) с доказанными клиническими преимуществами в отношении почек и сердечно-сосудистой системы.

Адаптировано из: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney Int.* 2022;102(5S):S1–S127. Доступ: <https://doi.org/10.1016/j.kint.2022.06.008>. Перевод на русский язык А.У. Земченкова, К.А. Вишневого и А.Ш. Румянцева, под редакцией Е.В. Захаровой.

Материал предназначен для специалистов здравоохранения. Имеются противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь, пожалуйста, с общей характеристикой лекарственного препарата Форсига (дапаглиолин). ООО «Астразенека Фармасьютикалз», 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, этаж 30. Тел.: +7 (495) 799-56-99, [www.astrazeneca.ru](http://www.astrazeneca.ru)  
RU-00000 Дата одобрения: 00.00.0000 Дата истечения: 00.00.0000